

EROINA **(Roba, ero)**

Categoria

Oppiacei

Composizione

L'eroina è una droga semisintetica che si prepara per doppia acetilazione della morfina o della morfina contenuta nell'oppio.

Venne sintetizzata per la prima volta nel 1874 e posta in commercio come forte analgesico. Nel 1924 (USA) e nel 1958 (Europa) venne tolta dal mercato farmaceutico per il suo potenziale tossicomaniogeno.

La "qualità" dell'eroina venduta al mercato illecito varia enormemente, in particolare relativamente al grado di "purezza", e generalmente la si ritrova in una composizione che varia dal 20 al 50%.

Modalità d'assunzione

Le forme di consumo dell'eroina sono racchiudibili in tre metodologie:

- ***Sniffing***

L'eroina penetra nell'organismo attraverso le mucose del naso ed entra nel flusso sanguigno in modo graduale. Il sangue porta la sostanza al cervello, e gli effetti sono percepibili entro 15 minuti circa.

- ***Smoking***

E' la modalità di assunzione con cui l'eroina raggiunge il cervello con maggiore velocità.

Con il riscaldamento della soluzione si producono dei vapori che vengono inalati permettendo l'ingresso dell'eroina nel flusso sanguigno attraverso i polmoni.

- ***Via endovenosa***

Con questa modalità di assunzione, che prevede la preparazione di una soluzione disciolta in acido citrico o ascorbico, un grosso quantitativo di sostanza passa dal flusso sanguigno direttamente al cervello.

Effetti

- Annullamento del dolore fisico
- Stato di benessere diffuso
- Ondata di calore che pervade il corpo (flash)
- Secchezza della bocca
- Sensazione improvvisa e acuta di euforia
- Senso di rilassatezza
- Difficoltà nella verbalizzazione
- Sensazione di pesantezza nelle estremità
- Nausea, vomito e forte prurito

Danni

- Decadimento dello stato generale di salute
- Abbassamento delle difese immunitarie
- Carie e perdita di denti
- Problemi al setto nasale
- Compromissione della funzionalità polmonare
- Flebiti e ascessi
- Collassi dei vasi sanguigni
- Infezioni batteriche
- Infezioni delle valvole cardiache
- Artrite e altri problemi reumatologici
- Malattie infettive (HIV, Epatite B e C)
- Nelle donne: amenorrea, diminuzione della fertilità e rischio di aborto in gravidanza

Danni da astinenza:

- Sudorazione
- Lacrimazione
- Insonnia
- Vampate di calore alternate a sensazioni di freddo
- Crampi e dolori addominali
- Aumento della pressione e della temperatura
- Tachicardia
- Respirazione rapida
- Ansia
- Irritabilità
- Paranoia
- Depressione